

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 15-6-68 790711

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K.

25 F.

Supplément n° 3 au Bulletin n° 92 - MAI 1968 -

20 MAI 1968

## V I G N E

MILDIOU : Après avoir procédé à un ébourgeonnage très soigné, appliquer un traitement anti-cryptogamique avant le 26 Mai.

ARAIGNÉES ROUGES - ERINOSE : Ajouter à la bouillie précédente, un acaricide de type systémique ou de contact ; ce traitement sera également valable contre l'acariose.

OIDIUM : Dans les climats très sensibles à ce champignon, ajouter un produit anti-oidium.

VERS DE LA GRAPPE : Les vols de papillons ont commencé, il est encore trop tôt pour effectuer un traitement de type curatif. Toutefois, dans les climats où la Pyrale se manifeste, ajouter un produit du type méthyl parathion.

Nous rappelons à nos abonnés qu'en cas de fortes précipitations ou de chutes de grêle, il est fortement conseillé de renouveler le traitement.

## ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : De très nombreuses taches étant apparues depuis quelques jours et les risques de nouvelles contaminations devenant importants, renouveler le traitement.

OIDIUM : Ajouter un anti-oidium à la bouillie ci-dessus.

PUCERONS - ARAIGNÉES ROUGES : Surveiller les cultures.

ANTHRACNOSE DU CERISIER : Effectuer une pulvérisation avec un fongicide de synthèse : Manèbe 160 gr. de matière active/hectolitre, Phaltane : 100 gr. de matière active, ou Doguadine à 90 gr. Si les traitements ne justifient à moins de 15 jours de la récolte, le dernier produit est seul recommandé.

MOUCHE DE LA CERISE : Les premiers adultes sont sortis en cage d'élevage, aussi nous conseillons d'effectuer un traitement dans les zones où l'on craint ce parasite, lorsque les premiers fruits changent de couleur, avec l'un des insecticides conseillés (Voir liste sur laquelle on ajoutera deux produits qui viennent d'être autorisés à l'emploi : le Phosphamidon et l'Endothion). Respecter strictement les délais d'emploi avant récolte :

- Diméthoate - Fenthion ..... 7 jours
- D.D.T. - Diazinon - Fenthion - Oléoparathion ..... 15 jours
- Endothion - Phosphamidon ..... 15 jours.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés  
des Avertissements Agricoles.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur  
de la Protection des Végétaux - Circonscription  
Phytopathologique "BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ" :

Imprimerie de la Station Bourgogne  
et Franche-Comté - Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.

H. SOULIE.

P 230

T.S.V.F.

## BETTERAVES

### PEGOMYIE OU MOUCHE DE LA BETTERAVE :

Des pontes sont actuellement trouvées dans presque la totalité des champs de betteraves. Le nombre d'oeufs déposés sous les feuilles est parfois important, pouvant atteindre jusqu'à 15 et 20 oeufs par feuille.

Un traitement est donc conseillé particulièrement dans les champs où la présence de nombreuses pontes est constatée. Utiliser l'un des produits habituellement préconisés contre ce prédateur (Liste des produits conseillés en début d'année).